



## ACIDENTES OFÍDICOS COM SERPENTES PEÇONHENTAS

Daiane Barbosa Faria<sup>1</sup>; Aline Lara Bueno Nogueira de Souza<sup>2</sup>; Reile Ferreira Rossi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universidade Estadual de Goiás, Quirinópolis-GO. daianebarbosabiologia@outlook.com.br

<sup>2</sup> SMECDL, Quirinópolis-GO.

<sup>3</sup> UEG, Quirinópolis-GO.

Cada vez mais o homem invade o espaço dos animais e provoca mudanças na paisagem, geralmente negativas. Entre as alterações que ameaçam a biodiversidade estão a perda e fragmentação de hábitat. Além da ameaça, muitos animais dividem espaço com o homem. Animais peçonhentos, por exemplo, são encontrados próximo a residências ou em meio à agricultura, o que pode gerar acidentes. As serpentes peçonhentas provocam acidentes de interesse médico, em alguns casos podendo evoluir para óbito. No município de Quirinópolis, Goiás, existem três gêneros de serpentes peçonhentas, *Bothrops*, *Crotalus*, e *Micrurus* que causam acidentes de interesse médico. Este trabalho teve como objetivo avaliar aspectos epidemiológicos dos acidentes por serpentes peçonhentas ocorridas no município de Quirinópolis, Goiás, entre 2007 e 2015. Foram analisadas “fichas de investigação de acidentes por animais peçonhentos”, pertencentes ao sistema de notificação da Secretária de Saúde do município de Quirinópolis-GO. Para as análises foram consideradas as seguintes variáveis: sexo, idade, mês do acidente, gênero da serpente envolvida no acidente, região anatômica atingida e gravidade. Foram notificados 99 acidentes provocados por serpentes peçonhentas no período de estudo. Sendo que o maior número de casos ocorreu no mês de fevereiro (n=25, 25,2%). Os acidentes foram causados por serpentes do gênero *Bothrops* (n=71, 71,8%) *Crotalus* (n=14, 14,1%) *Micrurus* (n=2, 2%) e não identificadas (n=12, 12,1%). Houve predominância do sexo masculino (n=76, 76,8%) e com faixa etária entre 21 a 30 anos de idade (n=22, 22,2%). As regiões anatômicas mais afetadas foram: pé (n=36, 36,4%) pernas (n=21, 21,2%) e dedo da mão (n=14, 14,1%). Quanto à gravidade dos envenenamentos (50,5%) foram classificados como leves, (41,4%) moderados e (7,1%) graves e (1%) não informado. A maior parte dos acidentes (71%) foi provocada por serpentes do gênero *Bothrops* e no período foi registrado apenas um caso de óbito. Em Quirinópolis os acidentes por serpentes peçonhentas acometem principalmente jovens do sexo masculino (76,8%) e os membros inferiores são os mais afetados (57,6%), comprovando a importância do uso correto de equipamentos de proteção individual.

Palavras-chave: Epidemiologia; Botrópico; Ofidismo.